

2.3. Guindaste comum e íris siberiana

Guindaste comum *grus grus* é uma espécie de ave da família Rowan. Ligeiramente maior que a cegonha branca (comprimento do corpo 96–119 cm, envergadura 180–222 cm), com pernas longas e pescoço longo e esguio. As penas de voo do ombro anormalmente alongadas formam uma "cauda" fofa (a cauda real é curta e perceptível principalmente em voo). A plumagem é predominantemente cinza-acinzentada-azulada, com penas de voo cinza-pretas e cabeça e pescoço preto-e-branco. A careca na parte de trás da coroa é vermelha. No verão, a maioria das aves tem um dorso de cor marrom-avermelhada que é acinzentado o resto do ano. Ambos os sexos são semelhantes, os machos são apenas ligeiramente maiores. As aves jovens distinguem-se por uma coloração castanho-ferruginosa clara da cabeça e pescoço e penas de voo de ombro menos volumosas.

A íris siberiana (*Iris sibirica*) é uma erva perene da família Iris (Iridaceae) que cresce na Europa, regiões temperadas da Ásia e espalhada na República Tcheca. É protegido na República Checa; Pertence à categoria de espécies altamente ameaçadas. A íris siberiana pode atingir até 100 cm de altura, é uma planta herbácea que cresce em touceiras. As folhas são estreitas e longas, o caule oco e redondo em forma. As flores são claros a azul-púrpura escuro, mas sua parte interna é mais clara com veios mais escuros. Eles florescem em maio e junho, tipicamente em prados úmidos a pantanosos, que são inundados na primavera e não são cortados, por isso crescem em prados despenteados. Toda a planta é venenosa.

